

Szczepionka przeciw	24h*	2 miesiąc	3 miesiąc	4 miesiąc	5 miesiąc	6 miesiąc	7 miesiąc	13-15 miesięcy	16-18 miesięcy	6 lat	12-13 lat	14 lat	19** lat
Gruźlica	BCG												
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B	wzwB	wzwB					wzwB						
Błonica, tężcowi, krztuścowi		DTP	DTP	DTP					DTP	DTaP		dTaP	dT
Poliomyelitis			IPV	IPV					IPV	IPV			
Hib		Hib	Hib	Hib					Hib				
Pneumokokom		PCV		PCV				PCV					
Odrze, śwince, różyczce								MMR		MMR			
Rotawirusom		RV											
Grypie								IIV (od 6 m.ż.) lub LAIV (od 24 m.ż. do 18 lat)					
Meningokokom		Men-B i MCV											
Ludzkiemu wirusowi brodawczaka												HPV	
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu A										wzWA			
Kleszczowemu zapaleniu mózgu										KZM			

* szczepienie powinno być przeprowadzone przed wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego, ** dT obowiązkowe lub dTaP zalecane,

szczepienia obowiązkowe	szczepienia zalecane
  	

BCG-szczepionka przeciw gruźlicy, **wzwB**- szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, **DTP**- szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, całokomórkowa, **DTaP**- szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, bezkomórkowa, **dTaP**- szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi bezkomórkowa z obniżoną zawartością antygenów błonicy i krztuśca, **IPV**- szczepionka przeciw poliomyelitis, zabita, **Hib**- szczepionka przeciw Haemophilus influenzae typu b, **MMR**- szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce, **PCV**- skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom, **RV**- szczepionka przeciw rotawirusom, **IIV**- szczepionka przeciw grypie (inaktywowana), **LAIV**- szczepionka przeciw grypie (żywa, donosowa), **MenB**- szczepionka przeciw meningokokom grupy B, **MCV**- szczepionka przeciw meningokokom grupy C, lub A, C, W, Y, **HPV**- szczepionka przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka, **KZM**- szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu.