

Szczepionka przeciw	24h*	2 miesiąc	3 miesiąc	4 miesiąc	5 miesiąc	6 miesiąc	7 miesiąc	13-15 miesięcy	16-18 miesięcy	6 lat	12-13 lat	14 lat	19** lat
Gruźlica	BCG												
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B	wzwB	wzwB					wzwB						
Błonicy, tężcowi, krztuścowi		DTP	DTP	DTP	DTP				DTP	DTaP		dTap	dT
Poliomyelitis			IPV	IPV	IPV				IPV	IPV			
Hib		Hib	Hib	Hib	Hib				Hib				
Pneumokokom		PCV		PCV				PCV					
Odrze, śwince, różyczce								MMR		MMR			
Rotawirusom		RV											
Grypie							IIV (od 6 m. ż.) lub LAIV (od 24 m. ż. do 18 lat)						
Meningokokom		Men-B i MCV											
Ludzkiemu wirusowi brodawczaka												HPV	
Ospie wietrznej									VZV				
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu A									wzwa				
Kleszczowemu zapaleniu mózgu									KZM				

* szczepienie powinno być przeprowadzone przed wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego, ** dT obowiązkowe lub dTap zalecane,

■ szczepienia obowiązkowe
 ■ szczepienia zalecane

BCG - szczepionka przeciw gruźlicy, **wzwB** - szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, **DTP** - szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, całokomórkowa, **DTaP** - szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, bezkomórkowa, **dTap** - szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi bezkomórkowa z obniżoną zawartością antygenów błonicy i krztuśca, **IPV** - szczepionka przeciw poliomyelitis, zabita, **Hib** - szczepionka przeciw Haemophilus influenzae typu b, **MMR** - szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce, **PCV** - skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom, **RV** - szczepionka przeciw rotawirusom, **IIV** - szczepionka przeciw grypie (inaktywowana), **LAIV** - szczepionka przeciw grypie (żywa, donosowa), **MenB** - szczepionka przeciw meningokokom grupy B, **MCV** - szczepionka przeciw meningokokom grupy C, lub A, C, W, Y, **HPV** - szczepionka przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka, **VZV** - szczepionka przeciw ospie wietrznej, **KZM** - szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu.