

# JAK CZĘSTO WYSTĘPUJĄ NIEPOŻĄDANE ODCZYNY POSZCZEPIENNE (NOP)?



## POZNAJ FAKTY



Populacja poddawana szczepieniom w Polsce jest liczna, dlatego **każdego roku rejestrowanych jest 3 000 do 4 000 NOP po szczepionkach podawanych w ramach Programu Szczepień Ochronnych.**



**Wszystkie NOP występują z częstością 0,05%** dla szczepień podawanych w ramach Programu Szczepień Ochronnych oraz 0,04% dla szczepień przeciw COVID-19.



Częstość występowania NOP **zależy od rodzaju szczepionki.**



Ciężkie NOP występują **niezwykle rzadko.**



W okresie ostatnich 20 lat **nie udowodniono związku przyczynowego między zgonem i szczepieniem.**

## Przykłady częstości występowania NOP:



Reakcje miejscowe po podaniu szczepionki MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce) występują z częstością 1 na 10 wykonanych szczepień.



Drgawki gorączkowe występują z częstością 1 na 2 250 podanych dawek szczepionki DTP (przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi z pełnokomórkowym składnikiem krztuśca) oraz 1 na 20 000 podanych dawek szczepionki DTaP (przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi z bezkomórkowym składnikiem krztuśca).



Ciężki NOP jakim jest reakcja anafilaktyczna występuje z częstością 1-1,1 osób / 1 000 000 dawek szczepionek podawanych w Programie Szczepień Ochronnych.