

NIEPOŻĄDANE ODCZYNY POSZCZEPIENNE (NOP)?

NOP to nadmierna reakcja organizmu na podaną szczepionkę, która wystąpiła w okresie 4 tygodni po jej podaniu*

Rozpoznanie NOP to zadanie lekarza po zbadaniu zaszczepionej osoby.

Typowe NOP:

- wysoka gorączka
- towarzyszące gorączce: kaszel, zaczerwienione gardło, czasem biegunka
- wysypka
- trudności z oddychaniem
- w przypadku dziecka kilkugodzinny płacz i problemy z utuleniem
- bolesny obrzęk i zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia
- złe samopoczucie
- drgawki, które mogą występować przy wysokiej gorączce (tzw. drgawki gorączkowe) lub niezależnie od temperatury ciała jako drgawki niegorączkowe



Ważne:

- 1 O każdej nietypowej reakcji po szczepieniu należy poinformować lekarza.
- 2 Większość objawów chorobowych występujących po podaniu szczepionki jest tylko zbieżnością czasową i nie ma związku przyczynowego ze szczepieniem.

Każdy zainteresowany może zgłosić podejrzenie NOP bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

**Wyjątek stanowią odczyny po szczepieniu BCG – w tych wypadkach kryterium czasowe jest znacznie wydłużone, co wynika ze specyfiki szczepionki.*