

Календар щеплень

Обов'язкові щеплення:

- 3-дозова схема первинної вакцинації немовлят проти коклюшу у віці 2, 4 та 5-6 місяців і додаткова доза у віці 16-18 місяців.
- 2 дози ревакцинації у віці 6 та 14 років.

Ревакцинація також рекомендується для дорослих – одна доза вакцини АКаДП раз на 10 років. Рекомендація стосується особливо тих, хто контактується з новонародженими і немовлятами, наприклад, медичний персонал чи люди похилого віку.

Безпека вакцинації

Вакцинація проти коклюшу супроводжується ризиком побічних реакцій після щеплення місцевого характеру (біль, почервоніння, набряк у місці ін'єкції) та системного характеру (лихоманка і дратівливість). Важкі побічні ефекти, такі як неугамовний плач, гіпотонічно-гіпореспонсивний синдром, фібрильні судоми, сильні алергічні реакції виникають досить рідко і проходять без довготривалих наслідків. Тяжкий перебіг побічних ефектів трапляється приблизно один раз на кожні 10 000 введених доз цільноклітинної вакцини і приблизно в 2 рази рідше після введення ацелюлярної вакцини.

Які протипоказання до щеплення?

Протипоказання до застосування щеплення проти коклюшу в першу чергу це: анафілактична реакція після попередньої вакцинації, захворювання, яке супроводжується високою температурою, алергія на інгредієнти вакцини та важка енцефалопатія. У цьому випадку лікар повинен вирішити, чи така попередня реакція не є ризиковною для подальшої вакцинації тим же препаратом, чи можливо його слід змінити, наприклад, на вакцину з безклітинним компонентом коклюшу.

Чому варто зробити щеплення від коклюшу?

В основному щеплення проти коклюшу ми робимо щоб знизити ризик тяжкого перебігу коклюша у немовлят та дітей раннього віку, для яких ця хвороба може бути смертельною. Щеплення також потрібні для зниження ймовірності зараження немовлят і циркуляції бактерій у суспільстві, особливо серед людей, які перебувають у безпосередньому контакті з маленькими дітьми. Коклюш у старших братів і сестер чи батьків, бабусь і дідусів часто взагалі не діагностується через нетипові симптоми (так звана стерта форма перебігу). Тому, будь-ласка пам'ятайте, що дорослі, які перебувають у близькому контакті з ще нещепленими малими дітьми, повинні бути ревакциновані.

ПАМ'ЯТАЙТЕ ЩО:

- **Актуальна кількість випадків коклюшу у Польщі, порівняно з багатьма іншими країнами, поки що не викликає занепоєння;**
- **Завдяки Програмі Обов'язкових Щеплень ми маємо високий відсоток (понад 95%) щеплених дітей.**
- **Дуже важливо приймати та реалізовувати рекомендовані щеплення від коклюшу, особливо людям з близького оточення маленьких дітей;**
- **Вакцинація вагітних жінок і людей з їх оточення та працівників педіатричних відділень допомагає знизити ризик захворювання немовлят.**

Щеплення проти коклюшу




Коклюш (інша назва кашлюк)

- Це гостре інфекційне захворювання дихальної системи, викликане бактеріями – коклюшною паличкою, які синтезують кашлюковий токсин;
- Хвороба може виникнути в будь-якому віці, але є найбільш небезпечною для неімунізованих або частково імунізованих немовлят та дітей раннього віку. Може викликати небезпечні ускладнення чи навіть смерть;
- Контагіозність (імовірність зараження при контакті з хворим) є дуже високою;
- Джерелом інфекції можуть бути як хворі з типовими так і з атипичними симптомами (наприклад, хронічний кашель, що триває багато тижнів) або ж хворі взагалі без симптомів;
- Ризик повторно захворіти коклюшем є навіть у тих, що вже перехворіли.

Ускладнення після коклюшу

Ускладнення після коклюшу можуть включати: порушення сну, апное, пневмонію, отит середнього вуха та різні види кровотечі (кон'юнктивальна, носова, субдуральна чи внутрішньомозкова гематома) і пневмоторакс. Більше 5% госпіталізованих дітей віком до 10 років мають неврологічні симптоми. У літніх людей в результаті хронічного, сильного кашлю може виникнути: порушення сну, нетримання сечі, пахова грижа чи переломи ребер.

Скільки випадків коклюшу є в Польщі?



Скільки є випадків коклюшу?

До введення універсальних щеплень у 1960 році коклюш був частою причиною смерті дітей до 1 року життя. Після введення щеплень кількість випадків зменшилась більше ніж у 100 разів, однак від середини 90-х років, також у країнах де стосуються загальні щеплення, спостерігається збільшення кількості випадків захворювання, особливо серед старших дітей і дорослих. Наприклад, у 2015 р. загалом в Європі було зареєстровано 40195 випадків коклюшу. Найвищий рівень захворюваності був у Німеччині (9000 випадків), Нідерландах (6178 випадків), Іспанії (6863 випадків) та Великобританії (5482 захворювання). В Польщі щороку реєструється від 2000 до 7000 випадків, але вже багато років не було смертельних випадків, викликаних коклюшем.

Вакцини проти коклюшу

Вакцину від коклюшу завжди подають у вигляді комбінованої КДП вакцини (одна ін'єкція проти коклюшу, дифтерії та правця). Дітям можна вводити цільноклітинну вакцину з компонентом коклюшу АКДП або вакцину з ацелюлярним кашлюковим компонентом (АКадП). Цільноклітинна вакцина містить цілі бактерії коклюшу, які під час синтезу вакцини деактивуються (вбиваються). Ацелюлярна вакцина містить від 1 до 5 відібраних очищених антигенів коклюшу. Підліткам і дорослим вводять вакцину АКадП зі зниженою кількістю антигенів коклюшу і дифтерії.

Рівень захисту від коклюшу після вакцинації з часом зменшується, тому схема вакцинації передбачає ревакцинацію.

