

JAKIE NIEPOŻĄDANE ODCZYNY POSZCZEPIENNE (NOP) MOGĄ WYSTĄPIĆ PO SZCZEPIENIU PRZECIWIW HPV?

NOP po szczepieniach przeciw HPV nie odbiegają szczególnie od tych, które obserwujemy po innych szczepieniach ochronnych.

NAJCZĘSTSZE NOP PO SZCZEPIENIU PRZECIWIW HPV:

odczyny miejscowe: ból, zaczerwienienie, obrzęk, rzadziej rumień

odczyny ogólne: bóle mięśni, bóle i zawroty głowy, uczucie zmęczenia, gorączka, bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka, zasłabnięcia i omdlenia

Wymienione objawy mają zwykle charakter łagodny, ustępują w ciągu 1-2 dni i nie są przeciwwskazaniem do podania kolejnej dawki

Ciężkie NOP: ryzyko reakcji anafilaktycznej po szczepieniu przeciw HPV jest bardzo małe (1,7/1 000 000 dawek) i tylko nieznacznie wyższe jak obserwowane po podaniu innych szczepionek (1-1,3/1 000 000 dawek). Reakcja taka stanowi przeciwwskazanie do podania kolejnej dawki szczepionki.



Szczepieniom przeciw HPV, podobnie jak w przypadku innych szczepionek podawanych nastolatkom towarzyszyły omdlenia. Nastolatki reagują na szczepienie silnymi emocjami (czasem jeszcze przed ukłuciem). Strach przed igłą może prowadzić do hiperwentylacji, zawrotów głowy, zasłabnięcia, a nawet omdlenia.

Bezpieczeństwo szczepień nastolatków można zwiększyć, wykonując wkłucie w pozycji leżącej, co zmniejsza ryzyko zasłabnięcia czy omdlenia i ich ewentualnych konsekwencji (np. urazu głowy w wyniku upadku). Omdlenie nie stanowi przeciwwskazania do podania kolejnej dawki szczepionki.

