

GRUŻLICA

szczepienia  info



CZYNNIK

Bakteria: prątki gruźlicy (*Mycobacterium tuberculosis*) namnażają się w płucach drogą krwi mogą przenieść się do innych narządów



OBJAWY

>3 tyg.
kaszel

GRUŻLICA PŁUC:

- kaszel
- krwioplucie
- ból w klatce piersiowej
- osłabienie
- gorączka
- stany podgorączkowe
- brak apetytu
- utrata masy ciała
- poty nocne
- osłabienie

GRUŻLICA POZAPŁUCNA:

CHOROBA PRZEBIEGA PRZEWLEKLE

- objawy w obrębie węzłów chłonnych
- kości
- nerek
- nadnerczy
- opon mózgowo-rdzeniowych
- mózgu

NIEBEZPIECZNA U OSÓB Z NIEDOBOREM ODPORNOŚCI



POWIKŁANIA

- odma opłucnowa
- ropniak opłucnej
- krwotok płucny
- zwłóknienie opłucnej
- prosówka
- gruźlica ośrodkowego układu nerwowego



SZCZEPIONKA BCG „ŻYWA”

- zawiera osłabione prątki bydlęce
- podawana śródskórną
- 1 dawka w okresie noworodkowym
- nie podaje się dawek przypominających



NIEDOBORY ODPORNOŚCI
SĄ PRZECIWWSKAZANIEM
DO SZCZEPIENIA!

PROFILAKTYKA

SZCZEPIENIE ZMNIEJSZA RYZYKO GRUŻLICY ROZSIANEJ I GRUŻLICZEGO ZAPALENIA OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH.

EPIDEMIOLOGIA

DROGI ZAKAŻENIA

- kropelkowa
- zakażeniu może ulec każdy, kto ma kontakt z osobą prątkującą
- dzieci zakażają się od chorych dorosłych po kontakcie z chorym (prątki w ślinie)

ZACHOROWANIA

>95%
to gruźlica płuc

ŚWIAT

najczęstsza
choroba zakaźna

POLSKA

średnia
zapadalność



chorują głównie dorośli

gruźlica u dzieci jest rzadka (dzięki szczepieniom)