


ŚWINKA

(NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNIC)

szczepienia 



CZYNNIK

wirus świnki obecny w ślinie i wydzielinie z dróg oddechowych osoby chorej

OBJAWY



- obrzęk
- ból ślinianki/ślinianek przyusznych i/lub podżuchwowych
- gorączka
- bóle głowy
- bóle mięśni
- zmęczenie
- brak apetytu



POWIKŁANIA

na ogół łagodna choroba, ale zdarzają się powikłania, częściej u mężczyzn niż kobiet

- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
- zapalenie trzustki
- zapalenie mózgu
- głuchota
- zapalenie jądra lub jajnika (u nastolatków i dorosłych)
- bezpłodność



PROFILAKTYKA

- szczepionka MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce)
- szczepionka „żywa” (z osłabionymi wirusami)

2 dawki: w 13-15 m.ż. i 6 r.ż.

osoba dorosła (nieszczepiona): 2 dawki w odstępie 4 tyg.

DWIE DAWKI SZCZEPIONKI ZAPEWNIĄ WYSOKĄ OCHRONĘ. SZCZEPIENIE JEST BEZPIECZNE.

NIE OPRACOWANO SKUTECZNEGO LEKU

EPIDEMIOLOGIA

DROGI ZAKAŻENIA:

- droga kropelkowa
- kontakt z przedmiotami zanieczyszczonymi śliną/wydzieliną z dróg oddechowych

150-220

tys.

zachorowań rocznie (w latach epidemicznych w Polsce) przed wprowadzeniem szczepień

1-2

tys.

w ostatnich latach liczba zachorowań ulega zmniejszeniu