

RÓŻYCZKA

szczepienia 



CZYNNIK

Wirus różyczki może prowadzić do poronienia, przedwczesnego porodu lub wad wrodzonych



OBJAWY


- wysypka
- powiększone węzły chłonne na karku i za uszami
- gorączka
- katar
- kaszel
- zapalenie spojówek



POWIKŁANIA

WYSTĘPUJĄ RZADKO: ○ ból ○ obrzęk stawów ○ małopłytkowość ○ zapalenie mózgu

NAJPOWAŻNIEJSZE: ○ zespół różyczki wrodzonej u dziecka zakażonego w trakcie życia płodowego
○ poronienie ○ poród przedwczesny ○ rozwój wad wrodzonych
○ zapalenie mózgu ○ małogłowie ○ upośledzenie rozwoju psychoruchowego
○ głuchota ○ ślepota



PROFILAKTYKA

- szczepionka MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce)
- szczepionka „żywa” (z osłabionymi wirusami)

2 dawki: w 13-15 m.ż. i 6 r.ż.

kobieta planująca ciążę (nieszczepiona w dzieciństwie):
2 dawki MMR w odstępie 4 tygodni.

**SZCZEPIONKA ZAPEWNI NIEMAL 100% OCHRONĘ PRZED RÓŻYCZKĄ.
DZIĘKI SZCZEPIENIOM DRASTYCZNIE ZREDUKOWANO CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA RÓŻYCZKI!**

EPIDEMIOLOGIA



dzieci nieuodpornionych kobiet są narażone na ryzyko, dopóki wirus różyczki krąży w danym regionie



9 na 10 kobiet zakażonych wirusem różyczki na etapie wczesnej ciąży straci dziecko lub urodzi się ono z zespołem różyczki wrodzonej