


ZAKAŻENIA SYNCYTIALNYM WIRUSEM ODDECHOWYM (RSV)

szczepienia 



CZYNNIK

Syncytialny wirus oddechowy (RSV)
powszechny wirus, wywołuje choroby
dróg oddechowych

OBJAWY

- kaszel
- gorączka
- katar
- kichanie
- duszność



POWIKŁANIA

- zapalenie oskrzelików (małe dzieci)
- zapalenie płuc

PO PRZECHOROWANIU MOŻE UTRZYMYWAĆ SIĘ NADWRAŻLIWOŚĆ OSKRZELI

CHOROBA WYNISZCZAJĄCA DLA OSÓB STARSZYCH,
Z CUKRZYCĄ, Z CHOROBY SERCA I PŁUC!



PROFILAKTYKA

SZCZEPIONKI INAKTYWOWANE

- oczyszczone białko/białka RSV
- adiuwant (wzmocnienie odpowiedzi na szczepienie)

DLA KOGO?

- 1 dawka
- osoby w wieku ≥ 18 lat
- kobiety w ciąży (ochrona niemowląt)

PRZECIWCIAŁA MONOKLONALNE

- bierne zapobieganie RSV

DLA KOGO?

- noworodki i niemowlęta

EPIDEMIOLOGIA

DROGI ZAKAŻENIA:

- droga kropelkowa
- ręce i przedmioty zanieczyszczone wydzieliną z dróg oddechowych osoby chorej

ZACHOROWANIA



zachorować może każdy



ryzyko u osób starszych



ryzyko u niemowląt (szczególnie wcześniaków)



ryzyko u osób z chorobami układu oddechowego, z wadami serca, po przeszczepach, w immunosupresji



można chorować więcej niż raz

EUROPA

270 tys. hospitalizacji
20 tys. zgonów osób w wieku >60 lat