


DUR BRZUSZNY

(CHOROBA BRUDNYCH RĄK)



CZYNNIK

- bakteria: pałeczki duru brzuszego (*Salmonella Typhi*)

OBJAWY



PO PRZEBYTYM ZAKAŻENIU MOŻE DOJŚĆ DO DŁUGOTRWAŁEGO NOSICIELSTWA PAŁECZEK DURU BRZUSZNEGO, GŁÓWNIEM W PĘCHERZYKU ŻÓŁCIOWYM

- gorączka • ogólne osłabienie • ból głowy • zaparcia • wzdęcia
- bezsenność • biegunka • zwolnienie tętna • apatia
- spowolnienie ruchowe • powiększenie wątroby • powiększenie śledziona • kaszel • charakterystyczna wysypka tzw. różyczka durowa na brzuchu



POWIKŁANIA

- perforacja jelita cienkiego
- zapalenie pęcherzyka żółciowego
- uszkodzenie wątroby
- odoskrzelowe zapalenie płuc
- uszkodzenie mięśnia sercowego
- zakrzepowe zapalenie żył
- zapalenie dróg moczowych
- zapalenie stawów i kości
- zapalenie opon-mózgowo-rdzeniowych i mózgu
- zaburzenia psychiczne

10% ŚMIERTELNOŚĆ U OSÓB NIELECZONYCH!

PROFILAKTYKA



SZCZEPIONKA POLISACHARYDOWA

- nie jest zalecana u dzieci poniżej 2 lat
- dawka przypominająca po 3 latach

DLA KOGO SZCZEPIENIA?

- w sytuacji klęsk żywiołowych powodujących utrudniony dostęp do czystej wody
- podróżującym w regiony świata, gdzie choroba wywołuje epidemie



SZCZEPIONKA ŻYWA

- zawiera osłabione bakterie
- trzy dawki 1, 3, 5 dzień
- do podawania dla osób w wieku 5 lat i powyżej

EPIDEMIOLOGIA

DROGI ZAKAŻENIA

- pokarmowa: przez wodę i żywność zanieczyszczone wydaliniami zakażonych ludzi, nie przestrzegających zasad higieny
- bezpośredni kontakt z nosicielami

ZACHOROWANIA

- POLSKA: choroba stanowiła problem w okresie międzywojennym, w czasie wojny oraz po II wojnie światowej
- obecnie rejestruje się pojedyncze zachorowania

- ŚWIAT: 16-33 miliony zachorowań/rok; 500 000 zgonów/rok
- najczęściej zachorowań w rejonach Azji Południowo-Wschodniej, Afryce oraz Ameryce Środkowej i Południowej